

Colza d'hiver : Attention aux pucerons !

L'été indien se poursuit avec des températures supérieures à 20°C, soit une dizaine de degrés au-dessus des normales saisonnières, avec très peu de pluies reçues jusqu'à présent.

La culture de colza d'hiver continue son développement. Les parcelles les plus développées couvrent le sol tandis que les champs souffrant davantage de la sécheresse présente des petites plantes peu développées. Les stades du colza d'hiver varient entre 3 et 8 feuilles, avec une majorité des champs suivis, situés entre 6 et 8 feuilles (BBCH16-18). Dans plusieurs champs, on remarque aussi que la première feuille formée est desséchée sur de nombreuses plantes ; ceci constitue sans doute une adaptation du colza face à la sécheresse extrême du sol. La rosée est bénéfique pour les plantes avec un feuillage plus développé.



Présence de gouttelettes à la surface des feuilles de colza, dûe à la rosée (Photo CC 06/10/26)

Dans les bassins, les captures de grosses altises sont variables : de 0 à 7 adultes dans 11 pièges relevés ce lundi, et de 32 à 53 adultes dans 5 pièges.

Les morsures d'altises sont encore observées, principalement dans les colzas les moins développés.

Les pucerons sont nettement plus présents actuellement, à la face inférieure des feuilles de colza d'hiver, suite aux conditions très chaudes et toujours très sèches favorisant les vols d'insectes. La situation varie d'un champ à l'autre mais est à surveiller de près. Quelques pucerons sont parasités.



Présence de pucerons verts à la face inférieure des feuilles de colza d'hiver (Photo CC 05/10/26)

Les pucerons affaiblissent les plantes, en suçant leur sève. Ils peuvent également transmettre des virus.

Depuis l'arrivée des premières variétés TuYV, c'est-à-dire tolérantes au virus de la jaunisse du navet, il y a 10 ans, de nombreuses variétés de colza d'hiver commercialisées en Belgique présentent cette tolérance.

1^{ère} année d'inscription UE des variétés de colza TuYV :

2017	2018	2019	2020	2021
(LG) ANGELICO (LG) ARCHITECT TEMPTATION	(LG) AMPLITUDE LG ASPECT CADRAN DYNAMIC FELICIANO KWS	DK EXPECTATION DUKE DUPLO (LG) AMBASSADOR LG AURELIA LG AVIRON	DK EXCITED DK PLACID DRONE HOSTINE KWS GRANOS LG ANTIGUA LG AUCKLAND LG AUSTIN RGT BANQUIZZ	DK EXBURY HANISSA HELIOTT KWS ARIANOS KWS DINGOS KWS SANCHOS LG ATLAS PIROL
2022	2023	2024	2025	2026
(RGT) CEOS DK EXPOSE LG ACADEMIC LG ARMADA	(LID) BESSITO COGNAC DK EXIGENT GATOR KWS DEMOS KWS MIKADOS LG ADAPT LG AVENGER LID INVICTO LID TEBO	DK EXQUIS HISCO KWS DOMINGOS LG ADAMANT LID MAESTRO NYMPHEA	(SF) AURANTIA DOMPTEUR (DK) EXANTRA LG ADRENALIN RGT EROS RGT KEOS	DK EXSPRINT LID ANETO

Variétés en gras : commercialisées en 2026, en Belgique.

Selon la présence de pucerons (à vérifier dans chaque champ) et la dynamique des populations cet automne 2026 très sec, un traitement insecticide peut se justifier.

Contre les pucerons en colza, seule la matière active flonicamide est autorisée du stade 2 feuilles à 8 feuilles (BBCH12-18). Une seule application est autorisée. La liste des insecticides autorisés sur colza se trouve sur le site du CePiCOP.

La météo va changer à partir de ce mercredi, avec l'arrivée annoncée de pluies, ainsi qu'une chute brutale des températures.

Christine Cartrysse, Centre Pilote CePiCOP

Gestion des adventices en céréales d'hiver

Au moment des semis, il est bon de rappeler que certains leviers agronomiques s'avèrent très utiles pour lutter contre les graminées en céréales d'hiver :

- La **rotation**, grâce à l'alternance des cultures d'hiver et de printemps, perturbe fortement le développement des populations de graminées adventices.
- Après trois ans, moins de 5% des semences de graminées enterrées profondément seront capables de germer. Le **labour** n'est donc pas à négliger, surtout s'il est positionné après un désherbage raté.
- Reporter la **date de semis** d'une quinzaine de jours permet de réduire la production grainière du vulpin d'environ 60%.

Une fois les céréales semées, les méthodes de lutte se limitent principalement aux interventions chimiques ou mécaniques.

Dans le cas de l'orge d'hiver et des froments semés tôt, la gestion chimique des adventices a lieu préférentiellement durant l'automne. En effet, c'est à ce moment que la majorité des mauvaises herbes va germer et croître. Jeunes et peu développées, ces dernières sont facilement et économiquement éliminées. De manière générale, il vaut mieux privilégier les applications de préémergence, souvent plus efficaces que la postémergence précoce. Attention, les herbicides d'automne sont des racinaires qui nécessitent une certaine humidité pour exprimer leur potentiel. En cette période plutôt sèche, il serait préférable de positionner le traitement en fonction des épisodes de pluie.

Depuis quelques années, le désherbage automnal des céréales est principalement basé sur le flufenacet, très efficace contre les graminées adventices. Cette molécule a été interdite au niveau européen et ne pourra plus être pulvérisée après le 10 décembre 2026. Cet automne constitue donc la dernière opportunité de l'utiliser.

Si vous disposez encore de flufenacet, il est pertinent de le réserver aux parcelles d'escourgeon et/ou aux parcelles à graminées adventices difficiles voire résistantes aux herbicides foliaires de printemps.

Si vous ne disposez plus de flufenacet, il sera sans doute nécessaire de combiner au moins deux molécules à profil antigraminées comme le prosulfocarbe, le chlorotoluron ou le triallate. Il pourrait également s'avérer judicieux d'y ajouter un produit à base de diflufenican, de beflubutamide ou d'aclonifen. Ces substances actives bien que principalement anticotylées permettront de compléter le spectre d'une part et de renforcer l'activité antigraminées de manière non négligeable d'autre part.

En escourgeon, les possibilités de rattrapage printanier sont peu nombreuses. Il sera important d'aller vérifier l'efficacité du traitement avant l'installation de l'hiver, dès le stade 3 feuilles – début tallage (BBCH 13-21) et décider d'appliquer, le cas échéant, un antigraminées foliaire (pinoxaden).

En froment, le choix variétal pourrait se révéler décisif. En effet, emblaver une variété sensible au chlorotoluron équivaut à se priver d'un outil potentiellement critique dans le contexte de l'interdiction du flufenacet.

Consultez les produits autorisés sur Phytoweb ou dans les listes (mises à jour faites par CORDER) : <https://www.centrespilotes.be/cp/cepiscop/cereales/produits-autorises/>

Nouvelle édition des carnets de champ disponible !

Le CePiCOP met gratuitement à disposition une nouvelle édition de ses carnets de champ papier, mise à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires.

🌱 Vous souhaitez continuer à enregistrer vos traitements au format papier ?

👉 Vous pouvez commander gratuitement votre carnet auprès du CePiCOP :

✉ info@cepicop.be

☎ 081/62.21.39

⚠ Pour rappel, à partir du 1^{er} janvier 2027, le registre devra obligatoirement être tenu au format électronique.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP

Contacts généraux :

✉ : info@cepicop.be

☎ : 081/62.21.39

Site internet :

🌐 : <https://centrespilotes.be/cp/cepicop/> (ou via la QR code ci-contre)

Réseaux sociaux :   



Prochain avertissement le 13 octobre 2026

Réalisé grâce au concours et au soutien de nos partenaires :



Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du CePiCOP