


Lutte intégrée contre les maladies

A. Nysten, O. Mahieu, B. Heens, N. Vannoppen et G. Wain
et technicien(ne)s associé(e)s

2 mars 2026 – Conférence CPL-Végémar



1. Une année culturale à faible nuisibilité !
2. Qu'est-ce que le FRAC ?
3. Le point sur les résistances
4. Agréations : retraits et nouveaux mélanges
5. Protection du froment
 - 5.1. Essai T1 alternatif
 - 5.2. Résistance variétale et rentabilité
 - 5.3. Résultats d'efficacité
 - 5.4. Réseau wallon d'essais fongicides
6. Adapter sa protection !
7. Protection de l'escourgeon



1. Année culturale 2025, à faible nuisibilité

- T°douce, printemps **sec**
- Une pression en **septoriose faible**
- Une rouille jaune discrète mais des sensibilités variétales (génétique YR15)
- Une rouille brune présente tôt (avril) et parfois des dégâts importants sur variétés sensibles
- Pas de crainte de *Fusarium* > peu de risques de mycotoxines
- Un panel de substances actives de plus en plus restreint
- Des efficacités parfois plus limitées (résistance, érosion)

Un traitement bien positionné,
la meilleure option de l'année 2025

1. Année culturelle 2025, à faible nuisibilité

New Disease Reports

Open Access

NEW DISEASE REPORT |  Open Access |  

First Large-Scale Breakdown of Yr15 Resistance to Wheat Yellow Rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*) Recorded Globally

[H. R. Davis](#), [T. Chia](#), [H. Rhodes](#), [C. Leaman](#), [C. M. Lewis](#), [L. Savva](#), [A. Korolev](#), [L. Boyd](#), [D. G. O. Saunders](#), [C. F. Nellist](#), [K. Kanyuka](#) 

First published: 30 September 2025 | <https://doi.org/10.1002/ndr2.70067> |  VIEW METRICS

Funding: The UK Agriculture and Horticulture Development Board funded the UKCPVS project (21120034a).

SECTIONS

The [Global Rust Reference Center](#) (GRRRC, Aarhus University) has confirmed Yr15-virulence from multiple cultivars and sites in continental Europe based on field observations and laboratory assessments of samples submitted by European collaborators

The United Kingdom Cereal Pathogen Virulence Survey (UKCPVS) was established in 1967 following a major yellow rust outbreak on the previously resistant wheat variety Rothwell Perdix. Since then, virulence in *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici* (*Pst*), the causal agent of yellow rust, has been routinely monitored across the UK.

In late winter to early spring 2025, unusually high levels of yellow rust infections on winter wheat varieties previously rated as highly resistant at both seedling and adult plant stages were observed in the counties of Northumberland and Tyne and Wear (Figure 1a). This indicated a potential major resistance breakdown, a concern soon confirmed by reports from across the agricultural industry. Importantly, disease persisted in many of these varieties to the adult plant stage (Figure 1b,c). Through the UKCPVS, urediniospores were multiplied from infected wheat samples by inoculation onto plants of the universally susceptible variety Victo maintained under controlled environment conditions until sporulation was observed. Following multiplication, three early-season *Pst* isolates (WVR25-



Confirmé en Belgique (U04 CRA-W) sur la variété Mariboss (porteuse de Yr15) qui a montré des symptômes de rouille jaune pour la première fois en 2025, suggérant que la virulence est présente au-delà du Royaume-Uni.

Qu'est-ce que cela implique cette saison ?


Surveillance de vos variétés emblavées au stade BBCH31 !

Groupe d'experts internationaux issus de l'industrie phytosanitaire et de la recherche
Objectif : préserver l'efficacité des fongicides > gestion et la prévention des résistances des pathogènes aux substances actives en fournissant des recommandations techniques
Bien gérer les résistances aujourd'hui, c'est garder des solutions efficaces pour demain !

2. Qu'est-ce que le FRAC ?

Tous les groupes de modes d'actions sont décrits sur le site :
<https://www.frac.info/media/ljsi3grv/frac-code-list-2025.pdf>

Ces groupes de modes d'action sont indiqués sur vos bidons !



The image shows two examples of pesticide labels. Both labels have a section titled 'Werkingswijze/Mode d'action' (Mode of action) which is circled in green. This section contains a table with the following information:

GROUP	7	3	FUNGICIDES
FUNGICIDES			

Below the table, the labels provide additional information:

- Label 1 (Left):**
 - Product: Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 65 g/l (6,3% w/w) bixafen, 65 g/l (6,3% w/w) fluopyram & 130 g/l (12,9% w/w) prothioconazole.
 - UFI: KJE3-90AP-R005-RJ7F
 - AgriRecover logo and website: www.agrirecover.eu
- Label 2 (Right):**
 - Product: Emulgeerbaar concentraat (EC) Bevat: 90 g/l (8,6 gew.%) metconazole (cis/trans 84/16).
 - UFI: SQ58-T0D5-G00K-HMAM
 - Large '5 L' volume indicator.

3. Le point sur les résistances


Populations de septoriose, on sait que:

- **Strobilurines** (Qol): résistance généralisée depuis plusieurs années
- **Triazoles**: évolutions des populations : faiblement résistantes TriLR **0%** / moyennement TriMR **5,5%** /fortement TriHR **70%**
- **SDHI**: CarR faible à élevé **36%** / CarHR élevé **14%**
- **MDR**: résistantes à plusieurs familles **25%**
- **Qil**: pas de résistance au *fenpicoxamide*

Peu d'évolution en 2025, c'est une bonne nouvelle !
Même un peu de répit ...

ARVALIS :

Figure 1 :
Evolution des populations de septoriose en France selon leurs phénotypes de résistance observés dans les échantillons du Réseau Performance depuis 2010



TriLR : souches faiblement résistantes au mode d'action IDM dont les triazoles sont les principaux représentants ; TriMR : souches moyennement résistantes aux IDM ; TriHR : souches hautement résistantes aux IDM ; CarR : souches résistantes aux carboxamides – fongicides ayant un mode d'action SDHI ; MDR : souches ayant une résistance croisée entre les modes d'action IDM et SDHI ; FR : facteur de résistance mesuré en laboratoire

3. Le point sur les résistances

Du côté des rouilles

Strobilurines et triazoles > fonctionnent toujours, très utiles !


Depuis 2022, certaines souches sont moins sensibles à certains SDHI comme le *benzovindiflupyr* (constaté en rouille brune)

> à combiner avec d'autres modes d'actions



Quelles bonnes pratiques pour maintenir l'efficacité des molécules dans le temps ?

1. Planter des variétés plus tolérantes **(et adapter sa protection!)**
2. N'intervenir que si cela est nécessaire (fct du climat de l'année et des obs.)
3. Alternier les substances actives des différentes familles
4. Une seule application de SDHI,...
5. Combiner avec les multi-sites



4. Agrégations : retraits et nouveaux mélanges

- Peu d'évolution dans les dossiers > report des dates
- Quelques nouveaux **mélanges** (pas de nouvelles s.a.)

Tableau 4 – Nouveaux mélanges phytopharmaceutiques fongicides disponibles sur le marché en céréales depuis 2025.

Composition du mélange	Famille chimique / Groupe FRAC*	Produits
150 g/l krésoxym-méthyl 100 g/l méfentrifluconazole	Strobilurine (QoI, FRAC 11) Triazole (DMI, FRAC 3)	Avidaxa, Daxur
303.03 g/l phosphonates de potassium 600 g/l soufre	Induction des défenses (FRAC P07) Multi-site (FRAC M02)	Tivesty, Aquicine Duo
75 g/l fluxapyroxad 150 g/l prothioconazole	SDHI (FRAC 7) Triazole (DMI, FRAC 3)	Avastel
100 g/l azoxystrobine 66.67 g/l méfentrifluconazole	Strobilurine (QoI, FRAC 11) Triazole (DMI, FRAC 3)	Elanvy
300 g/l folpet 120 g/l prothioconazole	Multi-site (FRAC M04) Triazole (DMI, FRAC 3)	Melvar Start
400 g/l prothioconazole	Triazole (DMI, FRAC 3)	Cortina
75 g/l bixafen 150 g/l spiroxamine 100 g/l trifloxystrobine	SDHI (FRAC 7) Amines (FRAC 5) Strobilurine (QoI, FRAC 11)	Cayunis



On attend de **nouvelles s.a.** qui ont été déposées mais n'ont pas encore reçu d'autorisations EU (exemple : *Pydiflumetofen* ou du *methyiltetraprole*)

4. Agréations : retraits et nouveaux mélanges

Maladies des céréales : statu quo en 2026 sur les substances actives et les modes d'action

Sophie Guyomard | Publié le 02/12/2025



Aucune nouvelle matière active fongicide ne viendra étoffer la gamme de solutions disponibles pour protéger les céréales à paille contre les maladies en 2026. Les évaluations concernant les solutions Adepydin de Syngenta et Pavecto de Sumitomo Phialgro se poursuivent encore.



Arvalis fait le point sur les solutions fongicides céréales disponibles pour les agriculteurs au printemps 2026. (Illustration: Petit/Blanc d'images / France3pictivitas)

« Les autorités européennes n'ont pas encore communiqué de décision concernant les deux nouvelles **substances actives fongicides** dont les demandes d'approbation sont engagées depuis quelques années », a indiqué Jérôme Thibierge, ingénieur protection intégrée chez Arvalis, à l'occasion du point annuel sur la lutte contre les **maladies des céréales à paille** de l'institut technique.

La première formulation de pydiflumetofen espérée pour 2027 ?

« Syngenta espère commercialiser sa première formulation de **pydiflumetofen** (Adepydin) solo (développée sous le code APN03) pour des applications au printemps 2027. Devrait suivre, pour le printemps 2028, l'arrivée d'une seconde formulation (codée APN04) associant 62,5 g/l de pydiflumetofen à 75 g/l de prothioconazole. Les essais menés par Arvalis depuis 2018 confirment que c'est l'un des représentants les plus efficaces de cette famille contre la **septoriose**, y compris sur des souches résistantes. Il dispose de plus d'un large spectre d'action sur les autres maladies des blés et des orges (notamment la ramulariose). Par son mode d'action, le pydiflumetofen est classé dans les SDHI (Frac 7) ».



Biocontrôle : des solutions émergent contre les maladies des céréales à paille

Stéphanie Ayrault
Le mardi 13 mai 2025
Protection des cultures



Cet article est référencé dans notre dossier :

Dossier Biocontrôle 2025, une enquête exclusive : tendances, innovations et perspectives



Écoutez cet article

Powered by Podie

00:00

00:00



Face aux attentes croissantes autour du **biocontrôle** pour réduire l'usage des phytosanitaires, des produits commencent à voir le jour pour gérer les maladies céréales à paille. L'innovation se poursuit, avec des recherches sur les métabolites microbiens et les micro-organismes vivants. L'enjeu reste de surmonter des défis d'efficacité et de positionnement dans les programmes de protection. Le point avec Jérôme Thibierge, ingénieur recherche et développement sur les maladies des céréales à paille chez Arvalis.

Où en est-on aujourd'hui des solutions de biocontrôle contre les maladies des céréales à paille ?

Chez Arvalis, le biocontrôle est une préoccupation importante et de longue date, avec des recherches engagées depuis quelques dizaines d'années. Aujourd'hui,

« À côté du soufre, quelques solutions issues des stimulateurs


5. Protection du froment

5.1. Un premier passage T1 avec des produits alternatifs/multisites (LB fév 2025)


Essai 2024 sur KWS Dag à Clermont

- **Différents traitements T1 (BBCH 32) : 29/04/24**
- **Traitement T2 (BBCH55, Ascra Xpro 1.5 L/ha) sur tous les obj. : 4/06/24**

(A) Sévérité de la septoriose sur F1 le 1/07/24 à Clermont



(B) Gain de rendement



Aquicine Duo
(phosphonates de
potassium + soufre),

Vertipin (soufre +
terpènes de pin)

ou Flosul (soufre)

**associés avec des
produits classiques
ou seuls, renforcent
l'efficacité contre la
septoriose en T1,
tout en maximisant
les gains de
rendement**

Utilité de ces
produits dans nos
programmes !

Même tendance dans l'essai 2025, et encore à confirmer avec plusieurs années d'essais !

5. Protection du froment

5.2 Résistance variétale et rentabilité

Le tableau compare pour les mêmes variétés présentes ces 6 dernières années, la perte de rendement entre une protection complète (min 2 traitements) VS sans protection.

La nuisibilité des maladies est **différente chaque année !**

Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement (kg/ha)	12.271	9.955	13.136	10.686	9.187	11.797
Perte de rendement (kg/ha)	410	784	677	1.658	3.768	1.261
Perte de rendement (%)	3	8	5	15	40	11



5. Protection du froment

5.2. Résistance variétale et rentabilité

Prendre en compte la variété dans votre choix de programme

(Exemple avec quelques données issues du Tableau 6 du LB de sept 2025)

Cotations maladies			Variétés	Gain et perte de rendement financier moyen (€/ha) en réduisant la protection fongicide pour un coût de traitement unique de 110 €/ha et un coût de protection complète de 190 €/ha et à un prix 170 €/tonne de froment									
Rb	Septo	Rj		2025		2024		2023		2022		2021	
				Trait. unique	Non traité	Trait. unique	Non traité	Trait. unique	Non traité	Trait. unique	Non traité	Trait. unique	Non traité
Variétés avec "défaut" maladies > 1 ou 2T obligatoires													
7,9	5,2	8,9	LG Farrier	99	69	-132	-211	79	-19	-	-	-121	-51
6	5,1	7,3	Gleam	-	-	-325	-478	34	-187	65	-155	-49	-25
4,2	6,2	7,7	Champion	31	-260	-455	-760	-97	-445	9	-225	-	-
4,5	6	6,5	Debian	115	-164	-520	-838	68	-123	-1	-309	-	-
7,4	5,2	7,9	Winner (b)	84	60	-237	-418	47	-46	33	27	-16	18
5,5	6,1	8,7	KWS Sverre	102	-23	-292	-724	54	-52	63	22	-32	2
Variétés avec "défaut" maladies > 1 T obligatoire, parfois 2													
5,5	4,5	8,2	LG Skyscraper	-	-	-349	-513	44	-193	48	-51	20	-12
6,4	5,3	6,5	Celebrity	73	-39	-242	-298	83	-98	60	-107	-	-
7,5	5,7	4,4	Campesino	124	-52	-646	-808	67	-63	37	-272	29	-73
Variétés plus tolérantes aux maladies > 1 T conseillé													
6,3	6,3	8,9	SY Revolution	113	30	-261	-484	22	-142	20	-18	42	-10
6,9	5,8	8	Chevignon	134	54	-186	-323	81	7	59	104	-18	42
7,2	6,1	8,8	KWS Extase	75	17	-224	-368	80	-15	39	39	4	39
5,9	5,7	7,6	KWS Keitum	92	58	-346	-547	54	-139	63	17	13	55
5,5	6,5	8,5	LG Keramik	107	-62	-404	-743	78	-56	40	132	57	145
7	6,6	8,4	SU Ecusson	83	56	-222	-370	67	-84	60	76	17	-12

Dans cette analyse,

on observe en fonction de la variété et de sa tolérance aux maladies ;

Il est rentable de ne faire qu'un seul passage !




Adapter son programme à la variété choisie et la saison

En 2024, deux passages étaient utiles pour presque toutes variétés > pression forte

5. Protection du froment

5.3 Résultats d'efficacité des produits (p.111)

Essai 2025 sur LG Skyscraper à Sart Risbart : sévérité septo et rb
Différents traitements BBCH39-43 : 13/05/25 pour tester les s.a.



Que retenir ?

Les produits déjà formulés avec **deux (ou trois) familles** chimiques différentes sont les plus efficaces:

- SDHI + triazole (+ strobilurine)
- picolinamide + triazole ou/et SDHI

Le **mefentrifluconazole** et le **fenpicoxamid** : les plus performants contre la septoriose.

Les **strobilurines**, peu performantes contre la septoriose, constituent de précieuses alliées pour la lutte contre les rouilles.

*certaines substances sont catégorisées PFAS : fluopyrame, mefentrifluconazole, tétraconazole

5. Protection du froment


5.4. Réseau wallon d'essais fongicides

4 partenaires en Wallonie

- 5 essais avec 3 variétés différentes et des profils de résistance contrastés
- Ce réseau existe depuis maintenant 13 ans!

--	Très sensible
-	Assez sensible
=	Moyennement sensible
+	Peu sensible
++	Résistante

N°	Partenaire	Localité	Variété	Résistance aux maladies			
				Septoriose	Rouille brune	Rouille jaune	Fusariose épis
2501	CRA-W	Clermont	Chevignon	=	=	+	+
2502		Clermont	KWS Dag	--	+	=	=
2503	CARAH	Ath	Positiv	=	=	++	=
2504	CPL- Végémar	Faimes	Winner	-	+	=	=
2505	CePiCOP	Lonzée	Winner	-	+	=	=



Protocole établi pour répondre à certaines questions et dans le respect des « règles résistances » : alternance et association de s.a. , un seul SDHI, multi-sites, quel délai entre traitement...

5. Protection du froment

5.4. Réseau wallon d'essais fongicides

Le protocole (p.116) en 2025 prévoyait

20 objets communs, 4 schémas différents :

- P2 à P6**, une application unique de fongicides au stade dernière feuille étalée (stade 39).
- P7 et P8**, une première application au stade dernière feuille (stade 39) avec le Revystar Gold à sa dose agréée (+ Stavento) suivie d'un relai au stade floraison (stade 65)
- P9 et P10**, deux pulvérisations rapprochées dans les premières semaines de campagne avec un passage au stade 2^{ème} nœud (stade 32) et ensuite au stade dernière feuille étalée (stade 39).
- P11 à P20**, différents fongicides appliqués au stade 2^{ème} nœud (stade 32) et à l'épiaison (stade 55).


Schéma de protection	Programme	Stade 32	Stade 39	Stade 55	Stade 65	Coût (kg/ha)
Témoin	P1					0
39	P2		Navura 1,5L Stavento 1,5L	2xA M		675
	P3		Velogy Era 1L Amistar 0,5L Stavento 1,5L	A+B C M		643
	P4		Univoq 1,5L Stavento 1,5L	D+A M		666
	P5		Revystar Gold 1,5L Stavento 1,5L	A+B M		834
	P6		Aspra Xpro 1,5L Amistar 0,5L Stavento 1,5L	A+B C M		819
	P7		Revystar Gold 1,5L Stavento 1,5L	A+B M	Prosaro 0,75L 2xA	1107
39/65	P8		Revystar Gold 1,5L Stavento 1,5L	A+B M	Protendo 300 0,62L A	1077
32/39	P9	Simveris 1L Aquino 1,2L Stavento 1,5L	A D M	Revystar Gold 1,5L	A+B	1375
	P10	Simveris 1L Stavento 1,5L	A M	Univoq 1,5L Comet New 0,3L	D+A C	1113
	P11	Simveris 1L Stavento 1,5L	A M		Univoq 1,5L D+A	996
	P12	Simveris 1L Stavento 1,5L	A M		Univoq 1,5L Comet New 0,3L C	1066
32/55	P13	Simveris 1L Pygmalion 2L	A P		Univoq 1,5L D+A	1009
	P14	Navura 1,5L Stavento 1,5L	2xA M		Simveris 1L Aquino 1,2L D	1216
	P15	Velogy Era 1L Amistar 0,5L Stavento 1,5L	A+B C M		Simveris 1L Aquino 1,2L D	1184
	P16	Simveris 1L Aquino 1,2L Stavento 1,5L	A D M		Velogy Era 1L Amistar 0,5L C	1184
	P17	Librax 1,5L Stavento 1,5L	A+B M		Univoq 1,5L D+A	1154
	P18	Simveris 1L Aquino 1,2L Stavento 1,5L	A D M		Revystar Gold 1,5L A+B	1375
	P19	Balaya 1L Stavento 1,5L	A+C M		Velogy Era 1L Amistar 0,5L C	1001
	P20	Univoq 1,5L Stavento 1,5L	D+A M		Revystar Gold 1,5L A+B	1349

5. Protection du froment

5.4. Réseau wallon d'essais fongicides

Efficacité contre septoriose sur F1, F2, F3 en 2025:

■ Efficacité F1 ■ Efficacité F2 □ Efficacité F3



Sévérité septoriose 2025 dans les témoins (peu importante):

F1 = 4,25 % ; F2= 16,8 %

En 2024, F1 = 59 % ; F2= 97,6 %


Pas de différences entre les programmes testés

Attention, ce n'était pas le cas en 2024 !

5. Protection du froment

5.4. Réseau wallon d'essais fongicides

Efficacité contre la rouille brune sur F1 et F2 à Lonzée, Faimès (Winner)



Sévérité rb dans les témoins:

2025 F1 = 7,9 % ; F2= 12,2 %
2024 F1 = 40 % ; F2= 70 %

Quelques différences significatives entre les efficacités sur F2 des doubles applications (BBCH 32//55)

Objet 13 stat. en dessous : pas de SDHI ou strobilurine pour contrôle de la rb

Objets 17 et 11 en deçà du reste, *fenpicoxamide* et *prothioconazole* meilleurs sur septo que sur rb


Intérêt des strobilurines

5. Protection du froment

5.4. Réseau wallon d'essais fongicides en 2025

■ Rendement net

■ Rendement brut



En moyenne, les témoins ont affiché des rendements de 10,6 T/ha

Rdt bruts identiques pour tous les programmes

Les meilleurs rdt **nets** :
 -Le témoin non-traité
 -Prog BBCH39 qui contiennent un produit composé de plusieurs s.a. + multisites

6. Adapter sa protection dès le semis, ajuster en saison !


Privilégier une variété tolérante et ajuster le programme en conséquence.

Exemple : une variété tolérante à la fusariose ne nécessite pas forcément de traitement à l'épiaison/floraison.

Des **pratiques culturales raisonnées** (date de semis, densité de semis, azote,...)

Ne traiter que si nécessaire en fonction :

- du climat,
- des conditions de culture,
- des prédictions des modèles,
- et des observations au champ.



6. Adapter sa protection dès le semis, ajuster en saison !

Lorsque traiter est nécessaire :

-Raisonner votre investissement au **risque réel** (nombre de passages, nombres de produits)

-**Combiner et alterner les différents modes d'action et les substances actives** entre deux traitements (SDHI, triazoles (DMI), strobilurines (Qol), Qil (*fenpicoxamide*), multisite, ...)

Exemple non-exhaustif :

T1 : triazole(s) + multisite

T2 : SDHI / Qil + triazole (autre s.a. qu'en T1) + strobilurine

-Les SDHI, Qil, strobilurines sont des familles très efficaces mais à risque de résistance > répéter la même famille sélectionne plus vite des souches résistantes.

Idéalement **1 application maximum par saison**

-Intégrer des fongicides **multisites** dans le programme

-**Éviter d'utiliser le même triazole** plus d'une fois par campagne (ex : *prothioconazole*).

Attention, plusieurs noms commerciaux existent pour la même substance active.

Fongibl , un OAD pour optimiser votre programme



Ma triser les 4 principales maladies en limitant les applications de fongicides

Orienter l'agriculteur vers le **programme fongicide optimal (32//55, 39, 39//65)**

D velopp  par Maxime Duvivier (plus d'infos dans le LB f vrier 2023)

stades 32 & 55

Conseils

FONGIBLE ne d tecte actuellement **aucun risque** sur votre parcelle.

Veillez consulter   nouveau FONGIBLE une fois que votre culture sera proche du stade BBCH 39 (derni re feuille enti rement d ploy e).

  stade 39

Conseils

FONGIBLE a d tect  un risque de **septoriose** et de **rouille brune** sur votre parcelle. Il vous est recommand  de vous orienter vers un programme   une ou deux applications aux stades BBCH 39 (et 65).

Veillez consulter de nouveau FONGIBLE lorsque votre culture sera proche de la floraison (stade BBCH 61) pour d cider de la pertinence de la seconde application.

Commentaires court terme

Attention, risque de **septoriose** et de **rouille brune** dans votre parcelle au stade derni re feuille d ploy e (stade BBCH 39). Il est vivement conseill  d'aller contr ler votre champ et d'intervenir si n cessaire.

Pour plus de d tails sur le choix des produits, veuillez consulter la rubrique ci-dessous. Toutes les infos se trouvent  galement dans le Livre Blanc.

[Plus de d tails](#)

[Plus de d tails](#)




Au stade derni re feuille (BBCH 39) :

Il est primordial de prot ger les deux derni res feuilles avec un traitement qui sera efficace jusqu'  la fin de la culture. C'est donc le stade id al pour appliquer un ou deux SDHI (*fluxapyroxad*, *bixafen*, *fluopyram* ou *benzovindiflupyr*) afin de profiter de leur longue r manence. Ce/ces SDHI doit/vent absolument  tre accompagn (s) de un ou plusieurs triazole(s) ou d'un Qii. Il est d s lors conseill  d'ajouter le *prothioconazole*, le *metconazole*, le *t buconazole*, le *mefentrifluconazole* ou le *fenpicoxamide* (Qii). Le m lange SDHI + triazole est efficace contre les rouilles. Le Qii n'est pas suffisamment efficace contre les rouilles et doit donc  tre associ  avec du *fluxapyroxad* (SDHI) ou du *benzovindiflupyr* (SDHI) afin de les contr ler. Enfin, l'ajout d'une strobilurine (*pyraclostrobine*, *fluoxastrobine* ou *azoxystrobine*) permet de renforcer l'action du triazole ou du SDHI contre les rouilles . L'utilisation d'un multi-sites tel que le *soufre* ou le *folpet* est fortement conseill    ce stade de la culture.

ant ou

sta


1. Une année culturale à faible nuisibilité !
2. Qu'est-ce que le FRAC ?
3. Le point sur les résistances
4. Agréations : retraits et nouveaux mélanges
5. Protection du froment
 - 5.1. Essai T1 alternatif
 - 5.2. Résistance variétale et rentabilité
 - 5.3. Résultats d'efficacité
 - 5.4. Réseau wallon d'essais fongicides
6. Adapter sa protection !
7. Protection de l'escourgeon



7. La protection de l'escourgeon

7.3.1 Incidence du choix variétal sur le schéma de traitement à adopter

Gain de rendement moyen généré par un T1 au stade 31-32, de 2023-2025




7. La protection de l'escourgeon

7.3.2 Incidence du choix variétal : conclusions

- Le traitement fongicide de **dernière feuille** garantit dans la majorité des cas, **sécurité et rentabilité**.
- **Traitement de montaison**: rentable que pour **50% des variétés testées**, pour un prix de l'escourgeon supérieur ou égal à **200 €/T**.
- Il est donc possible de faire l'**économie** de ce traitement **T1**.
Ce choix doit alors se raisonner sur base de :
 - la **résistance variétale** aux maladies et aux accidents culturels ;
 - la **pression en maladies** observée au moment de la montaison (voir les avertissements) ;
 - la **date de semis et la densité de semis** : plus l'orge a été semée tôt et dense et plus la pression en maladies peut être forte.

7. La protection de l'escourgeon

7.4. Résultats des essais fongicides : Essais en réseau en 2025 répartition des essais



7. La protection de l'escourgeon


7.4.1 Essais en réseau en 2025

- **Essais**
 - CARAH: essais **Ath** - LG Zelda et **Molenbaix** - Alienor
 - Cepicop: **Lonzée** – LG Zelda
 - CRAW: **Clermont** – LG Zebra
- **Présence moyenne toutes maladies : 10 % Feuille1 et 20 % Feuille 2**
 - Rouille naine (6 % F1 - 11% F2) 4 essais
 - Ramulariose/grillures (6 % F1 - 14% F2) 3 essais
 - Helminthosporiose (0 % F1 - 2,6% F2) 3 essais
 - Rhynchoporiose anecdotique dans ces essais
- **Programmes:**

	Stade 31-32:	Stade 39:
1 traitement		
2 traitements		

7. La protection de l'escourgeon

7.4.2 Essais en réseau en 2025: regroupement 4 essais



Comet N. = Comet New ; Flex. = Flexity ; Stav. = Stavento

Revytrex/ Ascra Xpro/ Revyflex Trio = PFAS

7. La protection de l'escourgeon

7.4.2 Essais en réseau en 2025: regroupement 4 essais

Rendement des doubles traitements 31-32//39 (Kg/ha)

Sévérité en % F1 F2

Sim. 1L + Comet N. 0,5L (31) // Ascra Xpro 1,2L + Stav. 1,5L (39)

A

Balaya 1,25L (31) // Ascra Xpro 1,2L + Stav. 1,5L (39)

AB

Protendo 300 0,65L (31) // Revytrex 1,5L + Comet N. 0,5L (39)

ABC

Simveris 1L (31) // Ascra Xpro 1,2L + Stav. 1,5L (39)

ABC

Fandango Pro 1,5L (31) // Revytrex 1,5L + Comet N. 0,5L (39)

ABC

Verben 0,8L (31) // Revytrex 1,5L + Comet N. 0,5L (39)

ABC

Lenvyor 1,2L + Flex. 0,4L (31) // Ascra Xpro 1,2L + Stav. 1,5L (39)

ABCD

Témoin non traité

D

F1 F2

T1=
+ 250
kg/ha

7000 9500 12000

0

20


40

Comet N. = Comet New ; Flex. = Flexity ; Stav. = Stavento

Revytrex/ Ascra Xpro/ Revyflex Trio = PFAS

7. La protection de l'escourgeon

7.4.3 Essais pluriannuels de 2023 à 2025: regroupement de 12 essais



Comet N. = Comet New ; Flex. = Flexity ; Stav. = Stavento

Revytrex/ Ascra Xpro/ Revyflex Trio = PFAS

7. La protection de l'escourgeon

7.4.4 Conclusions de ces essais

- Les **programmes en deux applications** aux stades 31 et 39 tiennent le haut du classement en termes d'**efficacité** et de **rendement brut**.
- Double traitement: réfléchi en termes de **rendements nets** (prix des produits et du passage).
- **Année à faible pression** des maladies telle que **2025: un seul traitement** appliqué au **stade 39** pouvait généralement suffire.
- Année à **plus forte pression** de maladies (2021 ou 2024): le T1 au stade 31-32 nécessaire pour protéger une **variété plus sensible** avec des produits tels que :
 - le *Lenvyor (+Flexity)*,
 - le *Simveris*,
 - le *Kestrel*, le *Verben*, l'*Input*, le *Protendo 300*
 - le *Fandango Pro*
 - associés ou non avec un partenaire comme le *Comet New* (sauf dans le cas du *Fandango Pro* qui contient déjà un triazole et une strobilurine)

7.5. Recommandations

- **Sensibilité variétale**
- **T1: stade 31-32**
 - **Triazoles:** prothioconazole, metconazole, méfentrifluconazole
 - **Triazole + strobilurine** (pyraclostrobine, fluoxastrobine, azoxystrobine, etc.)
 - **Le T1** de montaison peut montrer un effet de contrôle sur toutes les maladies et sur la ramulariose en freinant sa progression
 - **Modulation** de doses possible en T1
- **T2: stade 39**
 - **SDHI** à privilégier en T2
 - **Triazole + Strobilurine** ou **SDHI + triazole** (+ Strobilurine - pyraclostrobine)
 - Dans la lutte contre la ramulariose :
 - Le **prothioconazole** = triazole de référence
 - Le **méfentrifluconazole** = autre triazole montrant une bonne efficacité
 - Le **folpet** (multisite) apporte un plus dans la lutte contre cette maladie
 - Le **soufre**: résultats intéressants mais plus aléatoires d'une année à l'autre



**Merci pour votre attention
Excellente saison 2026 !**