COLZA D'HIVER : Liste complète des herbicides autorisés en Belgique

(Mise à jour : CePiCOP - Août 2026) Source officielle : www.fytoweb.be

Herbicides autorisés en Belgique en colza d'hiver :

Matières actives et concentrations		Produits commerciaux	N° agréation	Doses produit/ha	Firmes	Formulation	Nb d'applic. Max	Délai avant récolte (DAR)	Zone tampon (acte autorisation)	
Pré-semis (à incorporer) :										
napropamide	450 g/l	**DEVRINOL**	7716P/B	2-2,5 l/ha	CERTIS BELCHIM	SC	1	-	1m	2 l/ha en sols lourds, riches en humus.
		DEVRINOL	30228P/P	2-2,5 l/ha	EUROFYTO	SC	1	-	1m	2,5 l/ha en sols légers, pauvres en humus
		NAPROP 450	10899P/B	2-2,5 l/ha	PROTEX	SC	1	-	5m	Incorporation légère (2-3 cm) dans les 48 h. Longue rémanence. Très sélectif pour le colza.
Avec la **napropamide** en pré-semis à incorporer, possibilité de mélanger avec le **CONTANS WG** (9389P/B) (Conothyrium minitans – BAYER CROPSCIENCE) pour lutter biologiquement contre le sclérotinia (effets sur les sclérotes présents), avec incorporation rapide.										
Pré-levée :										
clomazone	360 g/l	**ANGELUS**	10755P/B	0,33 l/ha	ROTAM AGRO	CS	1	-	1m	Action par les racines et les tiges.
		CENTIUM 360 CS	8925P/B	0,33 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1m	Blanchiment passager.
		CENTIUM 360 CS	32961P/P	0,33 l/ha	EUROFYTO	CS	1	-	1m	
		CLOMASTAR (New)	38654P/B	0,33 l/ha	LIFE SCIENTIFIC	CS	1	-	1 m	
		CLOMATE	10144P/B	0,33 l/ha	ALBAUGH	CS	1	-	1m	
		CLOMAZON 360	32626P/P	0,33 l/ha	VSM AGROCHEM	CS	1	-	1m	
		CLOMELCO 360 (New)	40580P/P	0,33 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1m	
		CLOMINATOR 360 CS	30899P/P	0,33 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1m	
		CLOZONE	10920P/B	0,33 l/ha	UPL EUROPE	CS	1	-	1m	
		EVEA	10756P/B	0,33 l/ha	PROTEX	CS	1	-	1m	
		GAMIT 360 CS	11005P/B	0,33 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	1m	
		LIBECCIO	10732P/B	0,33 l/ha	SIPCAM OXON	CS	1	-	1m	
		SIRTAKI	10918P/B	0,33 l/ha	SIPCAM OXON	CS	1	-	1m	
		SIRTAKI	1389P/P	0,33 l/ha	PHYBELCO	CS	1	-	1m	
		UPSTAGE	10921P/B	0,33 l/ha	UPL EUROPE	CS	1	-	1m	
clomazone + dimethénamide-P	50 g/l + 400 g/l	**CONAXIS** (New)	38658P/B	1,25 l/ha	BASF	CS	1	-	5 m* (75%)	5 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 %. 1 application/24 mois.
clomazone + napropamide	35 g/kg + 400 g/kg	**ALTIPLANO DAM TEC**	10600P/B	3 kg/ha	FMC Chemical	WG	1	-	1m*	1 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 %. Un labour avant l'implantation de ray-grrass, trèfle, maïs, orge ou betteraves, après la récolte du colza traité.
clomazone + pendiméthaline	55 g/l + 275 g/l	**BISMARK**	30265P/B	1,5 l/ha	SIPCAM OXON	CS	1	-	20m	En pré-émergence, au plus tard 3 jours après le semis.

diméthenamide-P + métazachlore	200 g/l 200 g/l	**SPRINGBOK**	10030P/B	1,66 l/ha	BASF	EC	1	-	10m	2,5 l/ha selon l'acte d'autorisation (préémergence – 8 feuilles) **Max. 1 kg mérazachlore/ha/36 mois**
dimethenamide-P + metazachlore + quinmérac	200 g/l 200 g/l 100 g/l	**BUTISAN GOLD**	10295P/B	2,5 l/ha ou 1,7 l/ha	BASF	SE	1 2	- -	20m 20m	2,5 l/ha en fonction du type de sol. 1,7 l/ha en fractionnement, 2ème application de 0,8 l/ha, au stade 1-3 fe du colza. **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois** **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
dimethenamide-P + quinmérac	333 g/l 167 g/l	**TANARIS**	10928P/B	1,5 l/ha	BASF	SE	1	-	1m*	*1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75% **Max. 1,5 l/ha (=0,25 kg m.a. quinmérac)/36 mois**
métazachlore	500 g/l	**BUTISAN S** **FUEGO** **METAROCK** **RAPSAN 500 SC** **SULTAN 500 SC**	7362P/B 9192P/B 10462P/B 9381P/B 9488P/B	1,75-2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 1,75-2 l/ha 2 l/ha	BASF ADAMA CERTIPLANT PROTEX (Q-Chem) ADAMA	SC SC SC SC SC	2 1-2 1-2 1 1-2	- - - - -	10m 10m 10m* 10m 10m	1,75-2 l/ha en fonction du type de sol *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 % 2 l/ha en sols lourds et riches en humus **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois**
métazachlore + quinmérac	400 g/l 100 g/l	**BUTISAN PLUS** **RAPSAN TDI**	8531P/B 9887P/B	2-2,5 l/ha ou 1,25-1,75 l/ha	BASF GLOBACHEM	SC SC	1 2	- -	10m* 10m*	2-2,5 l/ha en fonction du type de sol Ou 1,25-1,75 l/ha (splitting) suivi d'un traitement à 0,8 l/ha en postém. hâtive (1-3 fe colza) *10 m avec technique réduisant dérive de min. 90 % **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois** **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
métazachlore + quinmérac	375 g/l 125 g/l	**RAPSAN TURBO** **SULTAN TOP**	9883P/B 10237P/B	2 l/ha 1,75-2 l/ha	GLOBACHEM ADAMA	SC SC	1 1	- -	10m* 5m	*10 m avec technique réduisant dérive de min. 90 % 2 l/ha avec 250 g/ha métazachlore **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois**
métazachlore + napropamide + quinmérac	214 g/l 206 g/l 71 g/l	**TORSO**	11017P/B	2,3-3,5-l/ha	GLOBACHEM	SC	1	-	5m	 **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois** **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
napropamide + quinmerac	500 g/l 100 g/l	**BRANDO**	28574P/B	1,25-2,5 l/ha	GLOBACHEM	SC	1	-	1m	En pré-émergence, au plus tard 3 jours après le semis. **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
pethoxamide	600 g/l	**JUAN** **KOBAN** **MOJANG** **PETOXELCOR 600** **SUCCESSOR 600**	11003P/B 9769P/B 28772P/B 32517P/P 9504P/B	2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha	FMC Chemical PROTEX FMC Chemical PHYBELCO FMC Chemical	EC EC EC EC EC	1 1 1 1 1	- - - - -	20 m 20 m 20 m 20 m 20 m	**Max. 1,2 kg pethoxamide/ha/36 mois** L'efficacité est insuffisante en conditions sèches, dans les sols riches en humus ou sur adventices déjà levées.
pethoxamide + clomazone	400 g/l 24 g/l	**QUANTUM POWER**	10253P/B	3 l/ha	FMC Chemical	EC	1	-	10 m	Symptômes temporaires de décoloration des feuilles de colza, possibles quelques semaines après émergence. (BBCH00-09) Si fortes précipitations, décolorations et retards de croissance voire éclaircissement de la culture. Non recommandé sur sols très perméables et moins absorbants.
quinmérac	250 g/l	**QUINDAPLUS**	35256P/B	1 l/ha	CERTIPLANT	SC	1		1 m*	*10 m avec technique réduisant dérive de min. 50 % **Max 0.25 kg quimmérac/36 mois.** En mélange avec un herbicide à base de métazachlore
Max. 1 kg de s.a. métazachlore/ha/3 ans (36 mois)										
Max. 0,25 kg de s.a. quinmérac/ha/3 ans (36 mois)										
Max. 1,2 kg pethoxamide/ha/3 ans (36 mois)										

Post-levée :										
Aminopyralide + halauxifène-méthyl + picloram	32 g/l 10 g/l 48 g/l	**LADIVA**	33629P/B	0,25 l/ha	CORTEVA	EC	1	120 j.	1 m*	Stade 2 feuilles étalées – 9 feuilles ou + *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 % **Max. 1 application/36 mois**
diméthenamide-P + métazachlore	200 g/l 200 g/l	**SPRINGBOK**	10030P/B	1,66 l/ha	BASF	EC	1	-	10 m	Graine sèche à 8 feuilles étalées. **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois**
dimethenamide-P + metazachlore + quinmérac	200 g/l 200 g/l 100 g/l	**BUTISAN GOLD**	10295P/B	2,5 l/ha ou 0,8 l/ha	BASF	SE	1 2	- -	20 m 20 m	2,5 l/ha sur adventices peu développées. **ou** 0,8 l/ha en fractionnement après une application de pré-émergence **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois** **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
dimethenamide-P + quinmérac	333 g/l 167 g/l	**TANARIS**	10928P/B	1,5 l/ha	BASF	SE	1	-	1m*	Cotylédons – 8 feuilles *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 % Germination jusqu'à adventices peu développées. **Max. 1,5 l/ha (=0,25 kg m.a. quinmérac)/36 mois**.
métazachlore	500 g/l	**BUTISAN S** **FUEGO** **METAROCK** **RAPSAN 500 SC** **SULTAN 500 SC**	7362P/B 9192P/B 10462P/B 9381P/B 9488P/B	2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha	BASF ADAMA CERTIPLANT PROTEX ADAMA	SC SC SC SC SC	2 1-2 1-2 1 2	- - - - -	10 m 10 m 10 m* 10 m 10 m	Stade **1-3 feuilles** du colza *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 % **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois**
métazachlore + quinmérac	400 g/l 100 g/l	**BUTISAN PLUS** **RAPSAN TDI**	8531P/B 9887P/B	0,8-2,5 l/ha 0,8-2,5 l/ha	BASF GLOBACHEM	SC SC	1 2	- -	10 m* 10 m*	Au stade **1-3 feuilles du colza** : 2-2,5 l/ha sur adventices peu développées (1 application) **ou** 0,8 l/ha en fractionnement en complément du traitement directement après le semis. (2 applications) *10 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 %
métazachlore + quinmérac	375g/l 125g/l	**RAPSAN TURBO** **SULTAN TOP**	9883P/B 10237P/B	2 l/ha 1,75-2 l/ha	GLOBACHEM ADAMA	SC SC	1 1	- -	10m* 5 m	**Cotylédons à 4 feuilles du colza :** *10 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 % Max 2 l produit/ha/36 mois. **Max. 1 kg métazachlore/ha/36 mois** **Max. 0,25 kg quinmérac/ha/36 mois**
clopyralide	100 g/l	**CLIOPHAR 100** **CLOPYRELCO 100 SL** **MATRIGON** **VIVENDI 100 SL**	11040P/B 1321P/P 8200P/B 9356P/B	1,5 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha	UPL PHYBELCO CORTEVA UPL	SL SL SL SL	1 1 1 1	- - - -	1 m 1 m 1 m 1 m	**Printemps** : après la reprise de végétation – début floraison Efficace si température supérieure à 15°C. Ajouter 1,5 l/ha MIX TOP Contre composées et chardons (20-30 cm) avant formation des boutons floraux. Ne pas mélanger avec un insecticide. Ne pas appliquer entre le 15 octobre et le 15 mars pour protéger les eaux souterraines.
clopyralide	300 g/l	**CLAP** **CLOPYFLEX 300**	10842P/B 29138P/P	0,4 l/ha 0,4 l/ha	SHARDA PHYBELCO	SL SL	1 1	- -	1 m* 1m*	8 feuilles – boutons floraux visibles Contre composées et chardons (20-30 cm) avant formation des boutons floraux *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 %
clopyralide + halauxifène-méthyl	120 g/l + 5 g/l	**KORVETTO**	10879P/B	1 l/ha	CORTEVA	EC	1	125 j.	5 m*	Début élongation – formation boutons. *5 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 % 125 jours avant culture suivante.
propyzamide	400 g/l	**KERB 400 SC** **KERB 400 SC** **PROFIFLO** (New) **SETANTA SC** **SOLITAIRE**	9606P/B 1191P/P 41575P/B 9960P/B 9961P/B	1,875 l/ha 1,875 l/ha 1,875 l/ha 1,875 l/ha 1,875 l/ha	CORTEVA PHYBELCO CORTEVA CERTIS BELCHIM CERTIS BELCHIM	SC SC SC SC SC	1 1 1 1 1	- - - - -	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	Au stade **4-5 feuilles** du colza.(BBCH14-15) Action racinaire. Nécessité de pluie. Action souvent lente par temps sec et températures basses. Peut être appliqué sur sol gelé ou juste après la reprise de végétation.

Anti-graminées spécifiques :										
Rem. : Laisser un intervalle de 5 jours entre le traitement antidicotylées et le traitement anti-graminées										
cléthodime	120 g/l	**SEDIM** (New) **SELECT PRIM** **SELECT PRO**	36330P/P 9334P/B 29302P/P	1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	GLOBACHEM ARYSTA LIFESC. VSM Agrochem	EC EC EC	1 1 1	120 j. 120 j. 120 j.	1m* 1m* 1m*	2 feuilles – stade « rosette » *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75 %
cléthodime	180 g/l	**BRIXTON**	11210P/B	1 l/ha	SIPCAM OXON	EC	1	-	1m*	2 feuilles – 6 pousses latérales visibles *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 %
cléthodime	240 g/l	**PHYBELDIM 240 EC Fin : 30/06/2027** **VEXTADIM 240 EC** **PHYBELDIM 240 EC (New)** **V-DIM**	29683P/P 11064P/B 36578P/P 36631P/B	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0.5 l/ha 0.5 l/ha	PHYBELCO VEXTACHEM PHYBELCO VEXTACHEM	EC EC EC EC	1 1 1 1	70 j. 70 j. 70 j. 70 j.	1m* 1m* 1m* 1m*	Cotylédons – stade « rosette » (BBCH10-30) *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50 %
cycloxydime	100 g/l	**FOCUS PLUS**	8905P/B	1,6-2,5 l/ha	BASF	EC	1	28 j.	1 m*	+ mouillant 1,6 l/ha (2-3 feuilles des graminées) 2-2,5 l/ha (graminées développées, ray-grass, repousses) 3-4 l/ha (repousses développées) 4-5 l/ha >< chiendent Compatible avec BUTISAN PLUS *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50 %
fluazifop-P-butyl = PFAS	125 g/l	**FUSILADE MAX** **FREQUENT** **PHANTOM**	9476P/B 10852P/B 11202P/B	1-1,5 l/ha 1-1,5 l/ha 1-1,5 l/ha	NUFARM SHARDA SHARDA	EC EC EC	1 1 1	- 90 j. -	1m 1m* 1m	Avant l'hiver. 1 l/ha >< vulpin (2-3 feuilles), panic pied-de-coq 1,5 l/ha (2-3 feuilles des graminées) folle avoine, ray-grass, jouet du vent, repousses céréales *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50 % **Max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 mois**
propaquizafop	100 g/l	**AGIL** **KALAMOS** **READY** **ZETROLA**	8514P/B 30143P/B 33324P/B 10727P/B	0,75-1,5 l/ha 0,75-1,5 l/ha 0,75-1,5 l/ha 0,75-1,5 l/ha	HERMOO JT AGRO SHARDA ADAMA	EC EC EC EC	2 1 2	90 j. 90 j. 90 j 90 j.	1m 1 m 1 m 1m	0,75-1 l/ha >< graminées annuelles et repousses de céréales 1-1,2 l/ha >< ray-grass et folle avoine 1,5 l/ha ou 2 x 0,75 l/ha >< chiendent (15-20 cm) **Max 1,5 l/ha/culture**
quizalofop-P-éthyle	50 g/l	**MACETA 50** **QUIZELCO** **TARGA MEGAMAX** **TARGA PRESTIGE**	11060P/B 26580P/P 10256P/B 8612P/B	1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-3 l/ha	GLOBACHEM PHYBELCO NISSAN NUFARM	EC EC EC EC	1 1 1 1	90 j. 90 j. 90 j. 90 j.	1m* 1m 1m 1m	+ mouillant ou huile 1 l/ha >< graminées annuelles (jeunes), vulpin, jouet du vent, panic pied-de-coq (1 applic.) 1,25-1,5 l/ha >< graminées plus développées, repousses céréales et folle avoine (1 applic.) 3 l/ha ou 2 x 1,5 l/ha >< chiendent (15-20 cm maximum) *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 75%
quizalofop-P-éthyle	50 g/l	**QUEEN 50 EC** (a)	10254P/B	1-2,5 l/ha	SHARDA	EC	1	90 j.	1m*	(a) sans adjuvant/mouillant 1 l/ha contre les repousses de céréales (1 applic.) 1-1,5 l/ha contre vulpin, jouet du vent, panic pied-de-coq (1 applic.) 1,25-1,5 l/ha contre folle avoine (1 applic.) 2,5 l/ha contre chiendent (1 applic.) *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50 % Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et/ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées.
quizalofop-P-tefuryl	40 g/l	**PANTERA**	10435P/B	2,25 l/ha	UPL	EC	1	60 j.	1 m*	Contre graminées annuelles et repousses de céréales *1 m avec technique réduisant la dérive de min. 90 %

Légende : **SC** = Suspension Concentrée
EC = Concentré émulsionnable

CS = Suspension de Capsules
WP = Poudre mouillable
SE = Suspo-émulsion
SL = concentré soluble
WG = Granulés à disperser dans l'eau

Pour la mise à jour des actes d'autorisation en Belgique, consulter le site www.fytoweb.be

Les produits suivants ont été retirés en 2025 et 2026 :

- WOPRO-PLUS (1347P/P fin : 30/11/2025), à base de cléthodime
- OCTAVION 120 EC (1265P/P – fin : 30/06/26), à base de cléthodime

Ils ne peuvent donc plus être utilisés en 2026 et seront à placer dans les PPNU (produits phytosanitaires non utilisables).

Dans le cadre de **l'éco-régime « Réduction d'intrants » 2027**, plusieurs herbicides sont **interdits** d'utilisation :

En prélevée : **pendiméthaline** (BISMARK = clomazone + pendiméthaline)

En post-levée : **propyzamide** (KERB 400 SC, PROFIFLO, SETANTA, SOLITAIRE)

La **métazachlore** peut encore être utilisée en colza, en 2026 (exception en 2026).

COLZA D'HIVER Herbicides : Zones Tampons à respecter en Région wallonne, avec la technique de pulvérisation avec minimum 75 % de réduction de la dérive (obligatoire depuis le 01/01/2026)

(Mise à jour CePiCOP – Août 2026)

				1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. **ZT min = 6 m**		2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc. **ZT min = 1 m**	
				Technique de pulvérisation		**Technique de pulvérisation**	
Matière active et concentration	**Produits commerciaux**	**N° autorisation**	Zone Tampon (acte d'autorisation)	75 %	90 %	75 %	90 %
napropamide 450 g/l	**DEVRINOL**	7716P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	DEVRINOL	30228P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	NAPROP 450	10899P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
clomazone 360 g/l	**ANGELUS**	10755P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS	8925P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS	32961P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOMASTAR (New)	38654P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOMATE	10144P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOMAZON 360	32626P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOMELCO (New)	40580P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOMINATOR 360 CS	30899P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOZONE	10920P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	EVEA	10756P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	GAMIT 360 CS	11005P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	LIBECCIO	10732P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	SIRTAKI	10918P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	SIRTAKI	1389P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	UPSTAGE	10921P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
clomazone 50 g/l + dimethenamide-P 400 g/l	**CONAXIS** (New)	38658P/B	5 m	6 m	6 m	5 m	1 m
clomazone 35 g/kg + napropamide 400 g/kg	**ALTIPLANO DAM TEC**	10600P/B	1 m (90%)	x	6 m	x	1 m
clomazone 55 g/l + pendiméthaline 275 g/l	**BISMARK**	30265P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m

diméthenamide-P 200 g/l + métazachlore 200 g/l	**SPRINGBOK**	10030P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
dimethenamide-P 200 g/l + metazachlore 200 g/l + quinmérac 100 g/l	**BUTISAN GOLD**	10295P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
dimethenamide-P 333 g/l + quinmérac 167 g/l	**TANARIS**	10928P/B	1 m (75%)	6 m	6 m	1 m	1 m
métazachlore 500 g/l	**BUTISAN S**	7362P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	FUEGO	9192P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	METAROCK	10462P/B	10 m (75%)	10m	6 m	10 m	5 m
	RAPSAN 500 SC	9381P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	SULTAN 500 SC	9488P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l	**BUTISAN PLUS**	8531P/B	10 m (90%)	x	10 m	x	10 m
	RAPSAN TDI	9887P/B	10 m (90%)	x	10 m	x	10 m
métazachlore 375 g/l + quinmérac 125 g/l	**RAPSAN TURBO**	9883P/B	10 m (90%)	x	10 m	x	10 m
	SULTAN TOP	10237P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
métazachlore 214 g/l + napropamide 206 g/l + quinmérac 71 g/l	**TORSO**	11017P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
napropamide 500 g/l + quinmerac 100 g/l	**BRANDO**	28574P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
pethoxamide 600 g/l	**JUAN**	11003P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	KOBAN	9769P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	MOJANG	28772P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	PETOXELCOR 600	32517P/P	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	SUCCESSOR 600	9504P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
pethoxamide 400 g/l + clomazone 24 g/l	**QUANTUM POWER**	10253P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
quinmérac 250 g/l	**QUINDAPLUS**	35256P/B	1 m (50%)	6 m	6 m	1 m	1 m
aminopyralide 32 g/l + halauxifène-méthyl 10 g/l + picloram 48 g/l	**LADIVA**	33629P/B	1 m (90%)	x	6 m	x	1 m
clopyralide 100 g/l	**CLIOPHAR 100**	11040P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOPYRELCO 100 SL	1321P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	MATRIGON	8200P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	VIVENDI 100 SL	9356P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
clopyralide 300 g/l	**CLAP**	10842P/B	1 m (75%)	6 m	6 m	1 m	1 m
	CLOPYFLEX 300	29138P/P	1 m (75%)	6 m	6 m	1 m	1 m
clopyralide 120 g/l + halauxifène-méthyl 5 g/l	**KORVETTO**	10879P/B	5 m (75%)	6 m	6 m	5 m	1 m

propyzamide 400 g/l	**KERB 400 SC** **KERB 400 SC** **PROFIFLO** (New) **SETANTA SC** **SOLITAIRE**	9606P/B 1191P/B 41575P/B 9960P/B 9961P/B	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
cléthodime 120 g/l	**SEDIM** (New) **SELECT PRIM** **SELECT PRO**	36330P/P 9334P/B 29302P/P	1 m (75%) 1 m (75%) 1 m (75%)	6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m
cléthodime 180 g/l	**BRIXTON**	11210P/B	1 m (90%)	x	6 m	x	1 m
cléthodime 240 g/l	**PHYBELDIM 240 EC Fin : 30/06/27** **VEXTADIM 240 EC** **PHYBELDIM 240 EC** **V-DIM**	29683P/P 11064P/B 36578P/P 36631P/B	1 m (50%) 1 m (50%) 1 m (50%) 1 m (50%)	6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m 1 m
cycloxydime100 g/l	**FOCUS PLUS**	8905P/B	1 m (50%)	6 m	6 m	1 m	1 m
fluazifop-P-butyl = PFAS	**FUSILADE MAX** **FREQUENT** **PHANTOM**	9476P/B 10852P/B 11202P/B	1 m 1 m (50%) 1 m	6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m
propaquizafop	**AGIL** **KALAMOS** **READY** **ZETROLA**	8514P/B 30143P/B 33324P/B 10727P/B	1 m 1 m 1 m 1 m	6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m 1 m
quizalofop-P-éthyle	**MACETA 50** **QUIZELCO** **TARGA MEGAMAX** **TARGA PRESTIGE**	11060P/B 26580P/B 10256P/B 8612P/B	1 m (75%) 1 m 1 m 1 m	6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m 1 m
quizalofop-P-éthyle	**QUEEN 50 EC**	10254P/B	1 m (50%)	6 m	6 m	1 m	1 m
quizalofop-P-tefuryl	**PANTERA**	10435P/B	1 m (90%)	x	6 m	x	1 m